

PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación y el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. Utilizar durante la aplicación: careta con filtros, antiparras, guantes y botas de goma. Usar ropa adecuada procurando que la misma esté siempre limpia evitando emplear la que se hubiera contaminado por su uso anterior, sin previo lavado cuidadoso. Finalizados los tratamientos, lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No pulverizar contra el viento. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. No destapar con la boca los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la dilución de este producto.

RIESGOS AMBIENTALES:
Aves: Ligeramente tóxico. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación. **Abejas:** Virtualmente no tóxico. **Organismos Acuáticos:** Moderadamente tóxico para peces. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.
TRATAMIENTOS DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: En caso que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado según las condiciones indicadas en esta etiqueta. Asperjar los remanentes del caldo de aplicación sobre campos arados, rastrojos no pastoreables o caminos de tierra, lejos del paso frecuente de personas.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y en todos los casos enjuagados con abundante agua. Para esto se deberá llenar el envase vacío con una cuarta parte de su volumen total, se ajustará el tapón y se sacudirá energicamente durante 20 o 30 segundos. Esta operación deberá repetirse al menos 2 veces. El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora, para ser utilizado en la tarea fitosanitaria prevista.
Una vez finalizada la tarea y previa inutilización de los envases vacíos, se los llevará al depósito correspondiente. Éste se ubicará en un sector aislado, muy bien delimitado, cubierto y al resguardo de factores climáticos.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original cerrado y en ambientes seguros, secos y frescos.
DERRAMES: Cubrir con tierra o arena, recogerlo en bolsas o tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. Lavar con abundante agua y detergente el área contaminada.
PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico.
Contacto dérmico: Lavar con abundante agua y jabón las partes expuestas al producto. Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.
Contacto ocular: Lavar con agua corriente y limpia por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos.
Ingestión: No se debe provocar el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No dar de beber leche ni sustancia grasa alguna. Trasladar al accidentado al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: MODERADAMENTE PELIGROSO-CLASE II (NOCIVO).
INHALATORIA: Categoría III (CUIDADO). **IRRITACION DERMAL (CUIDADO)** Categoría IV. **IRRITACION OCULAR: CORROSIVO OCULAR (PELIGRO)** Categoría I: Causa daño irreversible a los ojos. No sensibilizante. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Reacciones adversas temporales tales como alergias, caracterizadas por el enrojecimiento, irritación bronquial leve y enrojecimiento en las zonas afectadas de la piel, tipo dermatitis de contacto. En caso de ingestión pueden presentarse síntomas como náuseas, vómitos, diarreas, alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, anorexia, fiebre y cefalea. En caso de inhalación podrían ocurrir alteraciones respiratorias, tos, disnea, rinitis y aumento de las secreciones bronquiales.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
• Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247
• Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo - Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160
• Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires - Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806
• Centro de Consultas Toxicológicas CASAFE. Llamar a TAS durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727.



FUNGICIDA

PRODINSA

azoxi cypro

GRUPO 11

GRUPO 3

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICION:

Azoxistrobina: metil-(E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-iloxi]fenil]-3-metoxiacrilato20 g
Cyproconazole: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-butano-2-ol8 g
humectante, dispersante e inerte c.s.p.100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Inscripto en SENASA con el N°:

Fecha de vencimiento:

REGISTRADO Y PRODUCIDO POR



www.prodinsa.com.ar

Planta Industrial: Ruta Prov. 14 Km 12,8. (Ruta 14 y Ao12)

Tel + 54 341 6589203 / info@prodinsa.com.ar

CP (2119) Piñero / Santa Fe / Argentina

Contenido Neto: **5** Litro/s
PRODUCTO NO INFLAMABLE
Industria Argentina

NOTA:
No estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro control, la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales a personas, animales o cultivos causados por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.



NOCIVO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:
PRODINSA AZOXI CYPRO es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en los cultivos de ajo, cebada cervecera, maíz, maní, soja y trigo.
PRODINSA AZOXI CYPRO combina la acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo y erradicante de cyproconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos. Esta acción asegura un amplio espectro de control durante un período prolongado y reduce el riesgo de aparición de cepas resistentes.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación. Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 partes de su capacidad con agua, y poniendo en marcha los agitadores, agregar en primer lugar la dosis de coadyuvante recomendada; posteriormente incorporar la cantidad de **PRODINSA AZOXI CYPRO** según la dosis recomendada y completar finalmente el volumen total de agua. Pulverizar siempre con los agitadores en funcionamiento. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo. Puede utilizarse cualquier tipo de máquina pulverizadora, manual o motorizada. Agitar el envase antes de usar.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: El producto debe ser aplicado luego de que se seque el rocío. Utilizar máquinas pulverizadoras terrestres o aéreas. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.

Aplicaciones terrestres: Máquinas pulverizadoras convencionales de arrastre o autopropulsadas, con barras provistas de cono hueco. La aplicación de los picos debe ser superior a 40 lb/pg2 y el caudal de aplicación de no menos de 150 litros/ha. A fin de obtener un control efectivo es indispensable lograr una buena penetración del producto y la cobertura total y uniforme del lote.

Aplicaciones aéreas: El volumen mínimo de aplicación debe ser de no menos de 15 litros/ha. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	T.C.	MOMENTO DE APLICACION
Ajo	Roya del ajo (Puccinia allii)	450 cm3/ha	15	Realizar las aplicaciones al detectar los primeros síntomas o bajo condiciones predisponentes (temperaturas variables entre 10 y 25 °C y más de 6 horas con humedad superior a 90% o condiciones de rocío prolongado).

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	T.C.	MOMENTO DE APLICACION
Cebada cervecera	Escaldadura (Rhynchosporium secalis), Mancha en red (Drechslera teres)	400 cm3/ha	30	A partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas en la antéultima hoja (hoja bandera-1).
Maíz Maíz pisingallo	Antracnosis (Colletotrichum ramicola), Podredumbre de la espiga (Diplodia mayudis), Podredumbre de tallo y raíz (Fusarium verticillioides), Podredumbre de tallo y raíz (Diplodia macrospora), Tizón de las plántulas de cebada (Gibberella zeae) Roya del maíz (Puccinia sorghi) Tizón del norte (Exserohilum turcicum = helminthosporium turcicum)	500 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral paraafínico 42,8%	60	Aplicar en forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas, en estadios vegetativos del cultivo a partir de V7 (7 hojas desplegadas, Ritchie y Hanway, 1982) Aplicar a la aparición de las primeras pústulas, en estadios vegetativos del cultivo a partir de V7 (7 hojas desplegadas, Ritchie y Hanway, 1982). En caso de reinfeción, repetir la aplicación en R1 (Floración femenina: aparición de estigmas). Aplicar a la aparición de los primeros síntomas, en estadios vegetativos del cultivo a partir de V10 (10 hojas desplegadas, Ritchie y Hanway, 1982).
Maní	Viruela tardía del maní (Cercosporidium peronosatum), Viruela temprana del maní (Cercospora arachidicola)	440 cm3/ha	15	Realizar la primera aplicación con la aparición de los primeros síntomas y repetir en caso de ser necesario a los 21 días.
Soja	Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosis (Colletotrichum truncatum), Mancha marrón (Septoria glycines), Mancha ojo de rana (Cercospora kikuchii), Mildiu (Peronospora manshurica), Tizón de la hoja (Cercospora kikuchii) Tizón de la vaina y del tallo (Phomopsis spp.) Roya asiática de la soja (Phakopsora pachyrhizi)	250 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral paraafínico 42,8% 250-300cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral paraafínico 42,8%	30	Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de persistir condiciones favorables para enfermedad y que aparezcan nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación. Usar la dosis mayor en condiciones predisponentes severas.
Trigo	Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis), Mancha de la hoja del trigo (Septoria tritici), Roya amarilla o lineal del trigo (Puccinia striiformis), Roya anaranjada del trigo (Puccinia recondita), Septorios (Septoria graminis)	400 cm3/ha	30	Hoja bandera (Zadoks 3,9). Al aparecer los primeros síntomas.

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha, debe dejarse transcurrir 15 días para ajo y maní, 30 días para cebada cervecera y soja, 60 días para maíz. Tiempo de reintegro al área tratada: una vez que el producto se haya secado sobre la superficie de las hojas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: **PRODINSA AZOXI CYPRO** puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra. Para la mezcla con otros plaguicidas deberá realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo, además estos deberán estar autorizados para los mismos usos.

FITOTOXICIDAD: **PRODINSA AZOXI CYPRO** no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.
AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

